

阿曾浦漁場環境調査

観測日時

令和 6年 10月 21 日 月曜日 8時45分

天候 曇り／晴れ
観測 南島種苗センター

観測地点 (水深)	水深 (m)	水温 (°C)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)
1. 岸 信 夫 さん 前 (16.5)	1	25.7	5.0		珪 0
	3	25.8	4.9	32	珪 0
	5	25.7	4.7		珪 20
2. 大 江 (14.2)	1	25.8	5.4		珪 0
	3	25.7	5.0	31	珪 0
	5	25.6	4.5		珪 0
3. 道 方 (10.9)	1	25.5	5.4		珪 10
	3	25.7	4.4	31	珪 10
	5	25.5	4.2		珪 20
4. 毛 無 (18.2)	1	25.5	5.3		珪 10
	3	25.7	4.9	31	珪 0
	5	25.4	4.8		珪 0
5. この 浦 (中央) (13.9)	1	25.7	5.8		珪 0
	3	25.6	5.6	32	珪 0
	5	25.4	5.5		珪 0
6. この 浦 (奥) (9.8)	1	25.9	5.7		珪 30
	3	25.7	5.4	32	珪 0
	5	25.5	5.0		珪 0
7. テラマル (21.6)	1	24.7	6.2		珪 0
	3	24.8	6.2	33	珪 0
	5	24.8	6.2		珪 0
8. カ マ バ (12.4)	1	24.9	5.8		珪 0
	3	25.0	5.9	32	珪 0
	5	25.0	6.0		珪 0

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

今回検出された珪藻類の種類については「リゾソレニア インプリカータ」が多数でした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。