

阿曾浦漁場環境調査

観測日時

令和 6年 10月 28 日 月曜日 9時00分

天候 曇り

観測 南島種苗センター

観測地点 (水深)	水深 (m)	水温 (°C)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)	
1. 岸 信 夫 さん 前 (15.7)	1	25.4	6.2		珪	0
	3	25.2	5.8	32	珪	20
	5	25.0	6.4		珪	0
2. 大 江 (13.5)	1	26.0	4.8		珪	0
	3	25.0	5.9	32	珪	0
	5	25.0	5.9		珪	0
3. 道 方 (10.6)	1	25.4	5.1		珪	0
	3	25.0	5.6	32	珪	0
	5	24.9	5.6		珪	0
4. 毛 無 (17.6)	1	25.4	5.5		珪	0
	3	25.0	5.7	32	珪	0
	5	25.0	5.8		珪	0
5. この 浦 (中央) (13.1)	1	25.3	4.9		珪	0
	3	25.0	4.9	32	珪	0
	5	24.8	4.9		珪	0
6. この 浦 (奥) (9.2)	1	25.7	4.6		珪	0
	3	25.1	4.8	32	珪	0
	5	24.9	4.4		珪	0
7. テラマル (20.7)	1	24.4	6.1		珪	0
	3	24.3	6.1	33	珪	0
	5	24.4	6.0		珪	0
8. カ マ バ (11.6)	1	24.6	5.1		珪	0
	3	24.6	5.3	32	珪	0
	5	24.6	5.3		珪	0

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

今回検出された珪藻類の種類については「リゾソレニア インブリカータ」がでした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。