

阿曾浦漁場環境調査

観測日時

令和6年 6月17日 月曜日 9時00分

天候 晴れ

観測 南島種苗センター

観測地点 (水深)	水深 (m)	水温 (℃)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)	
1. 岸 信 夫 さん 前 (15.8)	1	24.8	5.3		珪	0
	3	23.7	5.5	34	珪	0
	5	22.7	5.8		珪	0
2. 大 江 (13.5)	1	25.8	5.8		珪	0
	3	23.7	5.9	33	珪	0
	5	22.8	5.9		珪	0
3. 道 方 (10.5)	1	25.6	5.4		珪	0
	3	23.7	5.4	33	珪	0
	5	22.5	5.3		珪	0
4. 毛 無 (17.1)	1	25.0	5.6		珪	0
	3	23.7	5.6	33	珪	0
	5	22.8	5.7		珪	0
5. この 浦 (中央) (13.2)	1	24.5	6.1		珪	0
	3	23.7	6.2	34	珪	0
	5	23.2	6.3		珪	0
6. この 浦 (奥) (9.1)	1	24.8	6.3		珪	0
	3	23.9	6.4	34	珪	0
	5	23.9	5.9		珪	0
7. テラマル (19.6)	1	23.3	5.9		珪	0
	3	23.0	5.9	34	珪	0
	5	22.7	5.8		珪	0
8. カ マ バ (11.6)	1	23.7	6.3		珪	0
	3	23.4	6.4	34	珪	0
	5	22.8	6.3		珪	0

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。