

阿曾浦漁場環境調査

観測日時

令和6年 6月 24日 月曜日 9時00分

天候 晴れ／曇り

観測 南島種苗センター

観測地点 (水深)	水深 (m)	水温 (℃)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)	
1. 岸 信 夫 さん 前 (15.7)	1	24.8	6.2		珪	0
	3	24.4	6.2	33	珪	0
	5	23.9	6.2		珪	0
2. 大 江 (13.5)	1	25.2	6.1		珪	0
	3	24.3	6.1	33	珪	0
	5	23.6	5.8		珪	0
3. 道 方 (10.2)	1	25.2	6.2		珪	0
	3	24.7	5.4	33	珪	0
	5	23.4	5.4		珪	0
4. 毛 無 (17.5)	1	24.8	6.4		珪	0
	3	24.0	6.0	33	珪	0
	5	23.2	5.6		珪	0
5. この 浦 (中央) (13.4)	1	24.6	6.3		珪	0
	3	24.3	6.1	33	珪	0
	5	24.4	6.0		珪	0
6. この 浦 (奥) (9.5)	1	24.7	6.2		珪	0
	3	24.6	6.2	33	珪	130
	5	24.9	6.0		珪	1000
7. テラマル (19.0)	1	24.2	6.1		珪	0
	3	23.5	6.4	33	珪	0
	5	23.1	6.4		珪	0
8. カ マ バ (12.1)	1	24.3	6.4		珪	0
	3	23.6	6.3	33	珪	70
	5	23.4	6.2		珪	0

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

今回検出された珪藻類の種類については「キートセロス属」が多数でした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。