

阿 曾 浦 漁 場 環 境 調 査

観 測 日 時

令和6年 7月 3日 水曜日 9時00分

天候 晴れ

観測 南島種苗センター

観 測 地 点 (水深)	水深 (m)	水温 (℃)	溶存酸素 (mg)	比重 (%)	プランクトン (細胞/ml)	
1. 岸 信 夫 さん 前 (15.7)	1	25.3	6.3		珪	2410
	3	24.7	6.2	32	珪	180
	5	23.9	6.5		珪	100
2. 大 江 (13.1)	1	25.6	6.3		珪	2370
	3	24.3	6.2	31	珪	600
	5	23.9	6.2		珪	120
3. 道 方 (10.2)	1	25.6	6.5		珪	1140
	3	23.9	6.2	32	珪	2340
	5	22.9	4.5		珪	2220
4. 毛 無 (16.9)	1	25.7	6.4		珪	2070
	3	24.4	6.2	32	珪	380
	5	23.8	6.0		珪	210
5. この 浦 (中央) (12.6)	1	25.7	6.5		珪	1870
	3	24.7	6.3	32	珪	1660
	5	24.5	6.5		珪	610
6. この 浦 (奥) (8.7)	1	26.2	6.7		珪	1050
	3	25.1	6.4	32	珪	310
	5	24.8	5.8		珪	140
7. テラマル (18.0)	1	24.8	6.2		珪	0
	3	24.4	6.5	33	珪	0
	5	23.7	6.5		珪	0
8. カマバ (11.2)	1	24.6	6.2		珪	380
	3	24.3	6.0	33	珪	100
	5	23.7	5.9		珪	80

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)
今回検出された珪藻類の種類については「キートセロス属」が多数でした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。