

阿 曾 浦 漁 場 環 境 調 査

観 測 日 時

令和6年 7月 9日 火曜日 9時00分

天候 晴れ

観測 南島種苗センター

観 測 地 点 (水深)	水深 (m)	水温 (℃)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)	
1. 岸 信 夫 さん 前 (14.7)	1	29.4	5.8		珪	2060
	3	28.4	6.0	32	珪	2110
	5	27.2	6.0		珪	470
2. 大 江 (14.1)	1	29.9	6.0		珪	2350
	3	28.5	6.1	32	珪	2090
	5	27.1	6.2		珪	1220
3. 道 方 (10.7)	1	29.9	5.8		珪	1510
	3	28.5	6.2	31	珪	1610
	5	26.7	6.0		珪	1090
4. 毛 無 (18.4)	1	30.1	6.2		珪	1590
	3	28.4	6.1	30	珪	760
	5	26.1	6.0		珪	340
5. この 浦 (中央) (13.8)	1	29.3	6.2		珪	630
	3	28.4	6.2	30	珪	980
	5	27.6	6.4		珪	410
6. この 浦 (奥) (9.9)	1	29.2	6.2		珪	430
	3	28.5	6.3	30	珪	520
	5	27.9	6.4		珪	720
7. テラマル (19.1)	1	27.5	5.9		珪	440
	3	27.0	5.9	33	珪	640
	5	25.5	6.2		珪	380
8. カ マ バ (12.3)	1	28.3	6.0		珪	730
	3	28.0	6.2	32	珪	880
	5	27.0	6.4		珪	1060

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

今回検出された珪藻類の種類については「キートセロス属」が多数でした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。