

阿 曾 浦 漁 場 環 境 調 査

観 測 日 時

令和7年 5月22日 木曜日 9時00分

天候 曇り

観測 南島水産センター

観 測 地 点 (水深)	水深 (m)	水温 (℃)	溶存酸素 (mg)	比重 (‰)	プランクトン (細胞/ml)
1. 岸 信 夫 さん 前 (15.8)	1	22.0	8.4		珪 0
	3	20.7	8.6	34	珪 190
	5	20.1	8.6		珪 270
2. 大 江 (13.8)	1	22.6	8.0		珪 120
	3	20.5	8.2	33	珪 0
	5	20.0	8.4		珪 170
3. 道 方 (10.9)	1	22.4	8.3		珪 0
	3	20.8	8.2	33	珪 250
	5	19.9	8.1		珪 0
4. 毛 無 (17.6)	1	22.2	8.1		珪 0
	3	20.7	8.3	33	珪 270
	5	20.0	7.9		珪 0
5. この 浦 (中央) (13.3)	1	21.5	8.2		珪 130
	3	20.6	8.4	33	珪 100
	5	20.4	8.8		珪 240
6. この 浦 (奥) (9.5)	1	21.6	8.5		珪 300
	3	20.9	8.7	33	珪 370
	5	20.7	8.0		珪 330
7. テラマル (18.6)	1	20.3	8.5		珪 0
	3	19.9	7.4	33	珪 0
	5	19.4	7.6		珪 0
8. カマバ (11.6)	1	20.3	7.5		珪 0
	3	19.9	7.5	33	珪 0
	5	18.8	7.9		珪 0

備 考 「珪」は珪藻類です。(二枚貝の餌等になります。)

今回検出された珪藻類は、小型の物が中心でした。

※比重(塩分濃度)は塩分濃度計(ATAGO MASTER-S/Mill α)で測定し、値は‰(パーミル)表記とさせていただきます。
南伊勢町沿岸域の海水の塩分濃度は33‰前後が基準となります。